

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

SINCALIDE POUR INJECTION

Sincalide pour injection

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **SINCALIDE POUR INJECTION** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **SINCALIDE POUR INJECTION**.

Pour quoi SINCALIDE POUR INJECTION est-il utilisé?

- SINCALIDE POUR INJECTION provoque la contraction de la vésicule biliaire et la libération subséquente de bile. Ceci facilite l'examen des canaux biliaires et permet de recueillir de la bile afin de diagnostiquer des problèmes de santé.
- SINCALIDE POUR INJECTION peut être administré en association avec un autre produit (l'épreuve à la sécrétine-sincalide) pour collecter les fluides et cellules du pancréas. Ceci peut être utilisé comme test pour le cancer du pancréas.
- SINCALIDE POUR INJECTION peut être administré pour traiter une absence de mouvement dans les intestins qui peut survenir après une intervention chirurgicale. Cette absence de mouvement cause parfois une accumulation de nourriture qui bloque l'intestin.
- SINCALIDE POUR INJECTION peut être administré pour augmenter les contractions des intestins. Ceci accélère le mouvement des colorants utilisés pendant les examens d'imagerie diagnostique.

Comment SINCALIDE POUR INJECTION agit-il?

SINCALIDE POUR INJECTION agit en contractant les muscles lisses (involontaires) du tube digestif.

Quels sont les ingrédients dans SINCALIDE POUR INJECTION?

Ingrédient médicamenteux : Sincalide

Ingrédients non médicamenteux : Acide chlorhydrique (et/ou hydroxyde de sodium), acide pentétique, chlorhydrate d'arginine, mannitol, métabisulfite de sodium, méthionine, monochlorhydrate de lysine

SINCALIDE POUR INJECTION est disponible sous les formes posologiques suivantes :

Poudre pour solution pour injection, 5 mcg / fiole

Ne prenez pas SINCALIDE POUR INJECTION si :

- vous êtes allergique (hypersensible) au sincalide ou à tout autre ingrédient de SINCALIDE POUR INJECTION ou à tout élément entrant dans la composition du contenant.
- vous devez éviter les repas à teneur élevée en gras, par exemple si vous avez des troubles du pancréas ou de la vésicule biliaire et de ses canaux, une infection de la vésicule biliaire, des calculs biliaires, une appendicite, des organes perforés (qui présentent des trous), une infection ou une inflammation de l'abdomen, des ulcères, un rétrécissement de l'orifice qui relie l'estomac à l'intestin grêle, un blocage ou une obstruction de l'intestin, tout autre blocage du tube digestif ou une douleur abdominale intense.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre SINCALIDE POUR INJECTION, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- de tout ulcère du tube digestif;
- de tout saignement intestinal;
- de toute indigestion ou de tout problème de reflux;
- de toute intervention que vous devez subir et qui nécessite un examen d'imagerie du tube digestif, car SINCALIDE POUR INJECTION peut accélérer le mouvement des colorants utilisés pendant ce type d'intervention;
- de tout calcul biliaire, particulièrement des petits calculs qui peuvent rester bloqués dans les canaux biliaires après que vous ayez reçu SINCALIDE POUR INJECTION;
- si vous êtes enceinte ou prévoyez de le devenir. SINCALIDE POUR INJECTION peut provoquer un avortement spontané ou le déclenchement prématuré du travail s'il est pris pendant la grossesse;
- si vous allaitez ou prévoyez de le faire.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits les médicaments alternatifs.

Comment prendre SINCALIDE POUR INJECTION :

SINCALIDE POUR INJECTION sera toujours utilisé à l'hôpital ou dans une clinique et il vous sera administré par un professionnel de la santé qualifié et spécialement formé qui vous dira tout ce que vous devez savoir sur son utilisation sécuritaire.

Dose habituelle :

Votre médecin déterminera la dose qui vous convient le mieux pour le type d'intervention que vous devez subir.

Surdosage :

Les symptômes de surdosage par SINCALIDE POUR INJECTION sont généralement légers et de courte durée. Les symptômes comprennent des malaises abdominaux, des crampes, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Des étourdissements et des bouffées de chaleur peuvent également survenir.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu trop de SINCALIDE POUR INJECTION, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à SINCALIDE POUR INJECTION?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez SINCALIDE POUR INJECTION. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent inclure :

- douleurs abdominales, crampes,
- envie urgente d'aller à la selle,
- goût amer dans la bouche,
- maux de tête,
- bouffées de chaleur, transpiration,
- douleur au point d'injection,
- tremblement des mains,
- éternuements.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
Hypersensibilité (réaction allergique) : fièvre, éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, gonflement, essoufflement, respiration sifflante, nausées, vomissements, diarrhée, étourdissement ou évanouissement			✓

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Entreposer les fioles de SINCALIDE POUR INJECTION à température ambiante (de 15 à 30 °C).

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de SINCALIDE POUR INJECTION :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (www.avirpharma.com), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-430-0436.

Le présent dépliant a été rédigé par :

AVIR Pharma Inc.

660 Boul. Industriel

Blainville, Québec

J7C 3V4

www.avirpharma.com

Dernière révision : 20 octobre 2022